

**Ruellia blechum** L., Syst. Nat. (ed. 10) 2: 1120. 1759; *Barleria pyramidata* Lam.; *Blechum pyramidatum* (Lam.) Urb.; *Blechum brownei* Juss.; *Blechum brownei* f. *puberulum* Leonard.

Hierbas erectas a inclinadas, hasta 0.5 m de alto; tallos más jóvenes cuadrangulares, aplicado-puberulentos. Hojas ovadas a ovado-lanceoladas, 2–6.5 cm de largo y 1–3 cm de ancho, ápice agudo, base cuneada a obtusa, márgenes crenados a enteros, escasamente pilosas a glabras; pecíolos hasta 1.4 cm de largo, pubérulos. Inflorescencias terminales, 1.5–7 cm de largo, pedúnculos hasta 15 mm de largo, aplicado-puberulentos, brácteas ovadas, 7.5–14 mm de largo, ápice agudo, base redondeada, laxamente estrigosas y densamente pubérulas, márgenes ciliados, bractéolas lanceoladas, 5 mm de largo, ciliadas; sépalos 3 mm de largo y 0.5 mm de ancho, ciliolados; corola 10–15 mm de largo, blanca volviéndose rosado pálida a lila con la edad. Frutos claviformes, ca 6 mm de largo, 3 mm de ancho y 1 mm de grueso. Común, áreas perturbadas en todo el país; 0–1300 m; fl ene–jul, fr feb–jul; *Neill 4498*, *Stevens 5905*; centroeste y oeste de México a Sudamérica, naturalizada en los trópicos del Viejo Mundo.